

جهت انجام صحیح نمونه گیری ادرار در نوزادان و جلوگیری از تکرار نمونه گیری توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم :

*نمونه گیری ادرار در نوزادان توسط کیسه ادرار استریل صورت میگیرد برای استفاده بهتر از کیسه ادرار ابتدا محل ادرار نوزاد را (ناحیه تناسلی) با آب ولرم و صابون (مخصوص نوزادان) شستشو می دهند، به گونه ای که هیچ روغن، پودر بچه و صابون های حاوی لوسیون روی پوست محل شسته شده باقی نماند بهتر است خشک شدن محل شستشو در دمای آزاد صورت گیرد و از حوله، دستمال کاغذی و مانند آن استفاده نشود.

*در مورد نوزاد پسر شستن آلت تناسلی و اطراف آن کافی است ولی در مورد نوزادان دختر بهتر است ناحیه تناسلی و اطراف آن تا مقعد شستشو داده شود. جهت وصل کردن کیسه ادرار استریل برای نوزاد پسر، لایه محافظ روی کیسه ادرار جدا شده و آلت تناسلی درون سوراخ کیسه قرار گیرد و محل چسب دار به اطراف محل آلت تناسلی چسبانده شود و برای نوزاد دختر لایه محافظ کیسه را جدا کرده و از قسمت تحتانی روی و اطراف ناحیه تناسلی را بکشید تا چین پوست باز شده و کیسه به دقت در اطراف این چین ها چسبیده شود، دقت فرمایید تا کیسه در تمام قسمت ها چسبیده شود .

*پس از جمع آوری ادرار در کیسه، بلافاصله درون ظرف استریل (برای کشت ادرار) و یا ظرف یراستریل (برای سایر آزمایش ها) قرار دهید و حداکثر تا ۲ ساعت به آزمایشگاه منتقل نمایید و در غیر اینصورت تا ۱۲ ساعت در دمای یخچال (۲ تا ۸ درجه سانتیگراد) نگهداری نمایید.

توجه شما به نکات یاد شده باعث افزایش صحت و دقت آزمایش خواهد شد.